

- 以下の写真の「糖尿病薬」を服用している方は造影剤による検査を受ける前に、必ず放射線科スタッフ、担当医師にお知らせください。
- ヨード系造影剤使用「前後48時間」は、以下に記載する薬剤を服用しないでください。

※もし以下の薬剤の服用を継続した場合、これら薬剤の腎臓での排泄が遅れ、副作用の乳酸アシドーシスが発現しやすくなります。

※乳酸アシドーシスとは、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、倦怠感、筋肉痛、過呼吸などの症状です。

薬剤名	薬剤写真(包装込)	錠剤の形体(表/裏)
メタクト配合錠LD		
メタクト配合錠HD		
エクメット配合錠LD		
エクメット配合錠HD		
メトアナ配合錠LD		
メトアナ配合錠HD		
イニシンク配合錠		
メトグルコ錠 250mg		
メトグルコ錠 500mg		
グリコラン錠 250mg		
メトホルミン塩酸塩錠 250mg・500mg 「ジェネリック各社」	「三和」「トーワ」「日医工」「ニプロ」「ファイザー」「明治」 「DSEP」「DSPB」「VTRS」「JG」「TCK」「TE」「SN」	
ジベトス錠 50mg		
ブホルミン塩酸塩腸溶錠 50mg「KO」		